

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons



Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
CC BY-NC-ND 3.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>






Sólidos Moleculares




- * Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993. **Capítulo 8.**
- * Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994. **Capítulo 2.**
- * Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Problems for Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994. **Capítulo 2.**
- * Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999. **Capítulo 16.**

- * Moeller, T., “*Inorganic Chemistry. A Modern Introduction*”, John Wiley & Sons, 1994. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994. **Capítulo 5.**
- * Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008. **Capítulo 7.** Traducción española de la 2ª Ed. “*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006. **Capítulo 6.**











© 2007 Encyclopædia Britannica, Inc.






Na pump.



1. Three sodium ions (Na^+) enter the enzyme from within the cell.
2. ATP phosphorylates the enzyme, causing it to pump 3 Na^+ out of the cell.
3. Two potassium ions (K^+) enter the enzyme from outside the cell.
4. The now-unphosphorylated enzyme pumps the 2 K^+ into the cell.




Estructura de la hemoglobina. Las subunidades proteicas se muestran en rojo y azul, y los grupos hemo, que contienen hierro, en verde. Fuente: Protein Data Base 1GZX.




Sólidos moleculares - Conglomerado de moléculas independientes unidas por diversas fuerzas.
Propiedades de los sólidos son las propiedades de sus moléculas.

La existencia de líquidos y sólidos implica la existencia de fuerzas de cohesión intermoleculares.


Radio covalente:



Radio metálico:



Radio iónico:



Intensidad relativa / decrecimiento con la **distancia** / direccionalidad

Radios atómicos, iónicos, covalentes, metálicos,
Enlazados y no enlazados, **Van der Waals**

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 290.

* Casabó i Gispert, J, "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Radio de Van der Waals



Gas Noble - Fuerzas de London, las más débiles de todas, disminuyen rápidamente con la distancia.

Equilibrio con las fuerzas de repulsión de Pauli,
Radio de Van der Waals.

Ne (sólido) $r_{\text{vdw}} = 160 \text{ pm}$

Xe (sólido) $r_{\text{vdw}} = 190 \text{ pm}$

El Radio de Van der Waals de un átomo puede ser variable, y depende de varios factores:

* Lo comprimido que se encuentre: $r(\text{sólido}) < r(\text{líquido}) < r(\text{gas})$

* Efecto de los sustituyentes: Xe Sólido $r_{\text{vdw}} = 220 \text{ pm}$

XeF₄ $r_{\text{vdw}}(\text{Xe}) = 170 \text{ pm}$

F muy electronegativo, le hace “*aparentemente*” más pequeño

Se toma como radio de Van der Waals la *distancia de no enlace*

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 290.

* Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 348.

Radio Iónicos

Enlace iónico estudiado en el **Tema 4.4**

Radio Iónico - Atracciones y repulsiones - Interacciones electrostáticas (fuertes).

Radio V.d.W. - Únicamente atracciones - Interacciones débiles

Li⁺/He (1s²) isoelectrónicos

F⁻/Ne (1s² 2s² 2p⁶) isoelectrónicos

Energía Interacción LiF = 400 kJ/mol


Distancia interiónica 210 pm

Energía Interacción He-Ne = 4 kJ/mol

Suma radios V.d.W. 340 pm

Radio Covalentes

$$2 \cdot r_{\text{cov}} = 2 \cdot 71 = 142 \text{ pm}$$




Distancia de enlace en la molécula F₂ = 142 pm
Solapamiento parcial de las densidades electrónicas.

Suma de los radios V.d.W. = 156 pm

Dos veces el radio iónico del F⁻ = 2 · 119 = 238 pm

$$2 \cdot r_{\text{vdw}} = 2 \cdot 78 = 156 \text{ pm}$$



Molécula F₂

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 293.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 290.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares

Enlace Covalente

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

- * Fuertemente direccional, como consecuencia del concepto de solapamiento.
- * Enlaces muy energéticos (fuertes):

P–P 200 kJul/mol		Covalente puro
C–C 346 kJul/mol		250–400 kJul/mol
H–H 432 kJul/mol		Promedio
- * Los átomos más pequeños dan mayor solapamiento, enlaces más fuertes.
- * Enlace más fuerte que cualquier otro tipo de interacción química, salvo enlace iónico.
- * A medida que se separan los átomos, disminuye el solapamiento, la fortaleza del enlace.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Casabó i Gispert, J, "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares

Enlace Iónico

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

- * Energía calculada con buena aproximación con la Ecuación de Born-Landé (*Tema 4.4*)

Se consideran únicamente interacciones de tipo electrostático, sin tomar en consideración Van der Waals u otras interacciones menores.

$$U_r = \frac{Z^+ \cdot Z^-}{r^+ + r^-} = \frac{Z^+ Z^-}{r_o} \quad \begin{array}{l} \text{Ligeras discrepancias entre} \\ \text{U teórico y U experimental} \end{array}$$

- * Energía del mismo orden de magnitud que el enlace covalente. Puntualmente puede haber compuestos iónicos con mayor o con menor energía que los covalentes.
- * En enlace iónico carece de direccionalidad, **NO direccional**, como corresponde a una interacción de tipo electrostático. No depende de la dirección, sólo de la distancia, tamaño y carga de los iones, N° de coordinación.
- * Las interacciones son atractivas / repulsivas, ambas muy fuertes.
- * Relativamente poco sensible a la distancia, sólo disminuye a razón de **1/r**

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares

Interacción Ión-Dipolo

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 297.


Dipolo Molecular – Dos cargas iguales y opuestas ($\pm q$), separadas a una distancia (d)

$$\mu = q \cdot d$$

Los dipolos se orientan alrededor de los iones presentes

Orientación "preferente" de las moléculas

NO direccionales



Similares a las interacciones Ión-Ión, pero tienden a ser más débiles al tener una separación de cargas menor que una carga iónica, siendo además más sensibles a la distancia $1/r^2$

Importantes en la solubilidad de compuestos iónicos en disolventes polares dando aniones solvatados

NaF en agua \Rightarrow $\text{Na}(\text{H}_2\text{O})_n^+$ y $\text{F}(\text{H}_2\text{O})_m^-$ similares a los complejos $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.


Fuerzas Intermoleculares

Interacción Dipolo-Dipolo


Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4^a Ed., Harper Collins, 1993, pp 298.

Dos dipolos interactuando entre sí pueden adoptar dos posibles disposiciones:

Configuración cabeza-cola
Moléculas grandes




Configuración antiparalela
Moléculas pequeñas



Similares a las interacciones Ión-Dipolo, pero tienden a ser aún más débiles, siendo aún más sensibles a la distancia, orientación *preferente*, **NO direccional**

$1/r^3$



Al aumentar la temperatura, aumenta la agitación térmica y el desorden, se pierde orientación, disminuyen las interacciones y disminuye la cohesión.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4^a Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3^a Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares


Interacción Dipolo inducido

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 298.

Ión-Dipolo Inducido NaF - CCl₄

Una partícula cargada (ión) próxima a una molécula no polar, deforma la nube electrónica induciendo la aparición de un dipolo Inducido.


Similares a las interacciones anteriores, pero más débiles y más sensibles a la distancia, orientación *preferente*, **NO direccional**



Dipolo-Dipolo Inducido H₂O - CCl₄

Un dipolo permanente próximo a una molécula no polar, deforma la nube electrónica induciendo la aparición de un dipolo Inducido.

Similares a las interacciones anteriores, pero mucho más débiles y mucho más sensibles a la distancia, orientación *preferente*, **NO direccional**



* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares

Dipolo inducido - Dipolo inducido Fuerzas de Dispersión de London Fuerzas de Van der Waals

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 299.

Moléculas Apolares, sin momento dipolar permanente.

Un dipolo instantáneo induce la formación de un dipolo inducido en la molécula vecina.

Son las interacciones más débiles de todas, y se manifiestan únicamente a distancias extremadamente cortas, **NO direccional**

$$1/r^6$$

Dependen de lo "deformable" que sea la nube electrónica, por lo que aumenta su importancia en moléculas grandes y pesadas. Aumenta rápidamente con el volumen molecular y el peso molecular, y son las responsables de muchas propiedades conocidas.

	T _{eb} ^a (K)
H ₂	2
D ₂	23
T ₂	25

	T _{eb} ^a (°C)	T _f ^a (°C)
He	-269	-270
Ne	-246	-249
Ar	-185	-189
Kr	-152	-169
Xe	-108	-140
Rn	-65	-71

	T _{eb} ^a (°C)	T _f ^a (°C)
F ₂	-188	-220
Cl ₂	-34	-101
Br ₂	+59	-7
I ₂	+184	+114

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Fuerzas Intermoleculares

Fuerzas de Repulsión

Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 299.

Además de estas fuerzas atractivas existen otras fuerzas repulsivas derivadas de las repulsiones interelectrónicas e internucleares.

A distancias extremadamente cortas la superposición de las nubes electrónicas y la proximidad de los núcleos hace que estas fuerzas aumenten extraordinariamente de magnitud $1/r^n$
(n = 5–12)

Fig - 113 Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

Fig - 114 Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

Tipo de Fuerzas	Intensidad	Dependencia de r
Enlace covalente	Muy fuerte	Compleja, de largo alcance
Enlace iónico	Muy fuerte	1/r largo alcance
Ión-dipolo	Fuerte	1/r ² corto alcance
Dipolo-Dipolo	Moderadamente fuerte	1/r ³ corto alcance
Ión-Dipolo Inducido	Débil	1/r ⁴ muy corto alcance
Dipolo-Dipolo Inducido	Muy débil	1/r ⁶ extremadamente corto alcance
Dispersión de London	Muy débil	1/r ⁶ extremadamente corto alcance

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., "Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity", 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 296.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 100.

* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 348.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, **pp 268**.

“*caso límite*” de interacción dipolo-dipolo – Identidad propia, estudio por separado.

Latimer y Rodebush – (1920) – Justificar la asociación el agua y el HF líquido, la gran ϵ dieléctrica del agua, la existencia de moléculas diméricas de ácido acético, la alta movilidad del H_2 en agua, la debilidad del NH_4OH como base, ...

Originalmente, interacción ión-dipolo o dipolo-dipolo ($H^{\delta+}$), pero la energía de interacción en moléculas con grupos $-FH$, $-OH$ y $-NH$ resulta demasiado elevada.

Por otro lado, no puede ser un simple enlace covalente, dado que el H sólo tiene un orbital (1s) con tan poca energía que es difícil que participe en más de un enlace.

Energía $F-H-F^-$ (HF_2^-) es ≈ 30 kCal/mol, intermedio entre un enlace covalente y una interacción intermolecular.

En enlace de hidrógeno es el más común y fuerte de las interacciones intermoleculares, salvo las interacciones iónica y covalente – el principio estructural más sencillo e importante en Química, Biología, Cristalografía, Mineralogía, Meteorología, Geología, ...

En enlace de hidrógeno se describe habitualmente en términos del isótopo ligero (1H), pero se presenta exactamente igual en los isótopos pesados D (2H) y T (3H).

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 92**.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, **pp 268**.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, **pp 300**.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, **pp 181**.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, **pp 351**.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Algunas características del Enlace de Hidrógeno Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 269.

Los enlaces de Hidrógeno implican habitualmente átomos muy electronegativos (F, O, N, Cl), aunque se conocen casos con Carbonos cuya electronegatividad ha sido exaltada por efecto de los sustituyentes.

Los datos energéticos indican una fortaleza intermedia entre los enlaces propiamente dichos (iónico y covalente) y las interacciones intermoleculares, del orden de 3–10 kCal/mol.

Tabla 9.4 Comparación entre las entalpías del enlace de hidrógeno con las entalpías de los correspondientes enlaces covalentes E—H (kJ mol⁻¹)

	Enlace de hidrógeno		Enlace covalente
HS—H···SH ₂	7	S—H	363
H ₂ H—H···NH ₃	17	N—H	386
HO—H···OH ₂	22	O—H	464
F—H···FH	29	F—H	465
HO—H···Cl ⁻	55	Cl—H	428
F···H···F	465	F—H	565

Atkins, P.; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F.
Traducción española de la 4ª Ed. “*Química Inorgánica*”,
McGraw-Hill Interamericana, 2008, pp 248.

Estos enlaces se forman y rompen con gran facilidad, y tan deprisa que son de particular importancia en sistemas biológicos donde los cambios de energía son mínimos.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Algunas características del Enlace de Hidrógeno Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 269.




La fuerza del Enlace de Hidrógeno aumenta cuando lo hace la electronegatividad de los átomos unidos al mismo. $\text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_2\text{Cl}_2 < \text{CHCl}_3$ $\text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{F}$

El tamaño del átomo implicado también es importante – N (pequeño) da puentes de hidrógeno más fuertes que el Cl (grande), pese a tener similar electronegatividad.

Longitud del Enlace de Hidrógeno, se da como distancia entre los dos átomos pesados. Más recientemente se utilizan las tres distancias y el ángulo implicados.

Criterios – Distancia inferior a la suma de los radios de Van der Waals.

En general, no siempre, los Enlace por Puente de Hidrógeno *no suelen ser simétricos* (como se suponía originalmente) sino *asimétricos*.



* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Evidencias

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 275.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 94 y 93.






Fig - 114



Gutiérrez Ríos, E., “*Química Inorgánica*”, 2ª Ed. Reverté, 1984, pp 334.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.


* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno


Evidencias

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 275.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.



Kotz, J. C.; Treichel, P. M., “*Química y Reactividad Química*”, 5ª Ed., Thomson Paraninfo, 2003, pp 517.



Atkins, P.; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F. Traducción española de la 4ª Ed. “*Química Inorgánica*”, McGraw-Hill Interamericana, 2008, pp 248.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.


Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Evidencias

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 275.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

- * Determinación estructural de compuestos cristalinos mediante difracción de neutrones.
- * Determinación Peso molecular del AcH en benceno, se obtiene 120 g/mol en lugar de 60 g/mol.



Calor de disociación del
dímero 13,8 kCal/mol

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno


Tipos de Enlace

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Recto Asimétrico $X-H \cdots Y$

Simétrico $X-H \cdots Y$



▲ FIGURA 13.28
Enlace de hidrógeno en el
fluoruro de hidrógeno gaseoso

Petrucchi, R. H.; Harwood, W. S.; Herring, F. G., “*Química general*”, 8ª Ed., Prentice Hall, 2003, reimpresión 2006, pp 501.




Fig - 116

Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. Traducción española de la 2ª Ed.
“*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006, pp 163.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno


Tipos de Enlace

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.




Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.



Curvo o angular



Bifurcado



Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., Traducción española de la 1ª Ed. “*Conceptos y Modelos en Química Inorgánica*”, Reverté, 1977, pp 236.




Fig - 118

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.


Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Tipos de Enlace

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Intermoleculares: entre distintas moléculas
Nº limitado o ilimitado



Intramoleculares: entre fragmentos de una misma molécula





Fig - 116

Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. Traducción española de la 2ª Ed.
“*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006, pp 163.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Tipos de Enlace

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Un caso especial es el FHF^- , en forma lineal, mientras que el FH sólido da lugar a cadenas en zig-zag con ángulos de 120° .



Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1988, pp 273.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 96.






Fig - 115

Solid HF



Atkins, P.; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F.
Traducción española de la 4ª Ed. “*Química Inorgánica*”,
McGraw-Hill Interamericana, 2008, pp 248.



* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.




Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Estructuras

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Grupos Finitos



* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Estructuras

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Grupos Finitos

Cadenas Infinitas





Fig - 115



* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Estructuras


Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.


Grupos Finitos

Cadenas Infinitas

Capas bidimensionales
infinitas



Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., Traducción española de la 1ª Ed.
“*Conceptos y Modelos en Química Inorgánica*”, Reverté, 1977, pp 236.



* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Estructuras

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.


Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Grupos Finitos

Cadenas Infinitas

Capas bidimensionales infinitas

Fig - 117



Lee, J. D., “*Concise Inorganic Chemistry*”, 5ª Ed., Chapman & Hall, Londres, 1998, pp 259.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Estructuras

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 272.

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 95.

Grupos Finitos

Cadenas Infinitas

Capas bidimensionales
infinitas

Estructuras tridimensionales




Fig - 116

Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. Traducción española de la 2ª Ed.
“*Química Inorgánica*”, Pearson Prentice Hall, 2006, pp 163.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Huheey, J. E., Keiter, R. L., Keiter, E. A., “*Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity*”, 4ª Ed., Harper Collins, 1993, pp 300.

* Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G., “*Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp 181.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Consideraciones Teóricas

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 274.

Modelo plenamente satisfactorio:

- * Permite calcular energías de enlace del orden de magnitud correcto.
- * Debe ser consistente con las propiedades direccionales observadas.
- * Debe interpretar correctamente el resto de propiedades del sistema.

Tres modelos propuestos:

- * Electrostático
- * Enlace de Valencia
- * Orbitales Moleculares

Ninguno de ellos resulta plenamente satisfactorio.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Consideraciones Teóricas

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 274.

Modelo Electrostático: Basado en interacciones ión-dipolo o dipolo-dipolo.

A favor:

- * El Enlace por Puente de Hidrógeno sólo se presenta en sistemas implicando átomos muy electronegativos.
- * Elude el problema de una covalencia 2 para el hidrógeno.
- * Buena concordancia con los valores de energía y las geometrías observadas.

Pegas:

- * La cortitud de algunas interacciones sugiere un cierto solapamiento.
- * No justifica la existencia de enlaces de hidrógeno simétricos (HF_2^-).

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Consideraciones Teóricas

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 274.

Modelo de Enlace de Valencia: Basado en considerar que en la molécula A–H·····B, un par electrónico de B está dirigido hacia el átomo H. Resonancia.



A favor:

- * Puede explicar la existencia de enlaces de hidrógeno simétricos.
- * Requiere delocalización del enlace covalente a ambos lados del hidrógeno, y la contribución de formas iónicas.

Pegas:

- * Impone una covalencia 2 para el hidrógeno.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.


* Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Consideraciones Teóricas

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 274.

Modelo de Orbitales Moleculares: Implicando un enlace de 3 centros y 4 electrones.



A favor:

- * Difumina la interacción covalente sobre los tres átomos implicados,
- * Puede explicar la existencia de enlaces de hidrógeno simétricos.

Pegas:

- * Impone una covalencia 2 para el hidrógeno.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Casabó i Gispert, J, “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Consideraciones Teóricas

Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 274.

Ninguno de los tres modelos propuestos resulta plenamente satisfactorio:

- * Electrostático
- * Enlace de Valencia
- * Orbitales Moleculares

El modelo que se utiliza habitualmente es el Electrostático, dado que es el más sencillo, permite un cálculo bastante aproximado de las energías implicadas, y resulta relativamente sencillo dotarle de una cierta direccionalidad propia del Enlace por Puente de Hidrógeno, conduciendo a resultados satisfactorios.

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.


* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”,
3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 97**.

- * Hidruros covalentes simples: HF, H₂O, NH₃, ... T_f^a habitualmente alta
 - * Interacción electrostática
 - * Polarización
 - * Fuerzas atractivas de V.d.W.
 - * Fuerzas repulsivas (electrones corticales)

- * Carácter direccional, que influye decisivamente en las estructuras cristalinas.



* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, **pp 268**.


* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 92**.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, **pp 351**.


Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry",
3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 97.

* Inter- Intra- molecular: Nitrofenol



–O–H puede dar interacciones de puente de hidrógeno con centros de elevada densidad electrónica: C=C, C≡C, Ph, ...



* Moeller, T. Traducción española: "Química Inorgánica", Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., "Concepts and Models of Inorganic Chemistry", 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.


* Casabó i Gispert, J., "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 97.

Interacciones Anión–Molécula



$r^+ \uparrow$, energía \uparrow

Se expande la red del MF para dar cabida al HF \Rightarrow Desprende energía

$\text{Li}^+ = 43 \text{ kJ/mol}$

$\text{K}^+ = 88 \text{ kJ/mol}$

$\text{Rb}^+ = 93 \text{ kJ/mol}$

$\text{Cs}^+ = 98 \text{ kJ/mol}$

$\text{Me}_4\text{N}^+ = 155 \text{ kJ/mol}$

$$U_r = \frac{Z^+ \cdot Z^-}{r^+ + r^-} \quad r^+ \uparrow, U_r \downarrow, T_f^a \downarrow$$

KF $T_f^a = 846 \text{ }^\circ\text{C}$

KHF₂ $T_f^a = 239 \text{ }^\circ\text{C}$

Haluros más pesados no dan estas especies

Sólo CsHCl₂ a baja temperatura

Cationes mayores lo estabilizan, R₄N⁺

H₃Cl₄⁻, H₂Br₃⁻, H₂I₃⁻

* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 97**.


Interacciones Anión–Molécula

Solubilidad de MF en HF debida a la formación de puentes de hidrógeno $F(HF)_n^-$

Situación totalmente análoga a la formación de $H(H_2O)_n^+$ (n = 1, 2, 3, 4)


Del mismo modo $OH^- + H_2O \longrightarrow OH(H_2O)_n^-$

KOH / NaOH utilizados como desecantes



Se conocen KOH·H₂O KOH·2H₂O KOH·4H₂O

Interacciones Anión–Molécula similares se presentan para diversos oxoácidos



* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, **pp 268**.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 92**.


* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, **pp 351**.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno


Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 97.

Interacciones Anión–Anión



Interacciones Anión–Cación



* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, pp 268.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, pp 92.



* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, pp 351.

Enlace de Hidrógeno – Puente de Hidrógeno – Interacción por puente de Hidrógeno

Sistemas Inorgánicos

Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 97**.




Interacciones Cation–Molécula



Espece	T_f^a (°C)	
HBr		Covalente, interacción débil, $T_f^a \downarrow$
HBr·H ₂ O		Iónicos, interacción fuerte, $T_f^a \uparrow$
HBr·2H ₂ O		$\text{Br}^- \quad \text{H}(\text{H}_2\text{O})_n^+$
HBr·3H ₂ O		$r^+ \uparrow, U_r \downarrow, T_f^a \downarrow$
HBr·4H ₂ O		

Para casa

Pensadlo y explicadlo con todo detalle por escrito



* Moeller, T. Traducción española: “*Química Inorgánica*”, Reverté, 1994, **pp 268**.

* Douglas, B.; McDaniel, D.; Alexander, J., “*Concepts and Models of Inorganic Chemistry*”, 3ª Ed., John Wiley & Sons, 1994, **pp 92**.

* Casabó i Gispert, J., “*Estructura Atómica y Enlace Químico*”, Reverté, 1999, **pp 351**.

Estructura de Sólidos Moleculares

Sin Interacción de Enlace de Hidrógeno intermolecular

Principio de máxima compacidad, casi siempre compacta, construida con la máxima utilización y economía del espacio disponible.

Modelo de empaquetamiento de moléculas de Kitaigorodskii (1955): “*huecos*” y “*protuberancias*”

Gases Nobles (Ne, Ar, Kr): Estructura Cúbica Compacta, similar a los metales
He, Hexagonal compacta a altas presiones.

Moléculas diatómicas:

$T^a \approx T^a$ fusión, agitación térmica elevada, libre rotación,
empaquetamiento de “pseudo-esferas”.

H_2 , β - N_2 , CO Hexagonal compacto

γ - O_2 , β - F_2 Cúbico compacto

$T^a \ll T^a$ fusión, poca agitación, rotación congelada, orientación preferencial
estructuras menos simétricas, deformadas

Cl_2 , Br_2 , I_2 Ortorrómbicos


Estructura de Sólidos Moleculares

Sin Interacción de Enlace de Hidrógeno intermolecular

Empaquetamiento de moléculas cíclicas S_8


Casabó i Gispert, J, "Estructura Atómica y Enlace Químico",
Reverté, 1999, pp 354.

Fig - 119



Empaquetamiento hexagonal de cadenas helicoidales de α -Se

Casabó i Gispert, J, "Estructura Atómica y Enlace Químico",
Reverté, 1999, pp 367.



Estructura de Sólidos Moleculares


Con Interacción de Enlace de Hidrógeno intermolecular

La direccionalidad del Puente de Hidrógeno manda, condicionada por el poliedro de coordinación. Similar al empaquetamiento en sólidos covalentes, empaquetamiento de poliedros. Estructuras menos compactas (hielo flota).

0°C, 1 atm, Hielo h (H_h), estructura hexagonal “derivada” de la hexagonal tipo diamante, muy similar a la tridimita $[OH_4] / [SiO_4]$.


Casabó i Gispert, J, “Estructura Atómica y Enlace Químico”,
Reverté, 1999, pp 355.

Fig - 120



Casabó i Gispert, J, “Estructura Atómica y Enlace Químico”,
Reverté, 1999, pp 340.

Fig - 64



Estructura de Sólidos Moleculares

Con Interacción de Enlace de Hidrógeno intermolecular

Al igual que C, SiO₂, el hielo presenta varias formas polimórficas dependiendo de la forma en que se empaqueten los poliedros:

H_h Hexagonal tipo diamante (tridimita)

H_c Cúbica tipo diamante (cristobalita)

Casabó i Gispert, J, "Estructura Atómica y Enlace Químico", Reverté, 1999, pp 356.

Fig - 121

Relaciones estructurales				
Tipo de red	Elementos	Compuestos tipo XY	Compuestos tipo XY ₂	
Red cúbica tipo diamante	C (diamante), Si, Ge, Sn (gris)	SiC (carborundo) ZnS(blenda de cinc o esfalerita)	SiO ₂ (cristobalita)	H ₂ O (H _c) (estable sólo a bajas temperaturas)
Red hexagonal tipo diamante	Diamante hexagonal (estable sólo a altas presiones)	ZnS (wurtzita)	SiO ₂ (tridimita)	H ₂ O (H _h) (estable en condiciones normales)